

ANTI PUNAISES DE LIT

AÉROSOL JET DOUBLE À ACTION CHOC ET LONGUE DURÉE CONTRE LES PUNAISES DE LIT

Composition

Pralléthrine (N°CAS 23031-36-9) 0.075% m/m
Cyphénothrine (N° CAS 39515-40-7) 0.15% m/m

Action

DIGRAIN® ANTI PUNAISES DE LIT est un aérosol insecticide à action choc spécialement formulé pour lutter contre les punaises de lit. Il permet de traiter plancher, plinthes, meubles, pieds de lit, lattes, sommiers... Son embout spécial fissures est idéal pour les endroits difficiles d'accès.

Application et dose d'emploi

Avant d'utiliser le produit, inspecter les lieux à traiter pour repérer les traces de punaises (plancher, plinthes, meubles, pieds de lit, lattes, sommiers...).

Bien agiter avant emploi. Pulvériser à 40 cm de distance sur les insectes, leurs lieux de passage et leurs cachettes à raison de 5 secondes par mètre linéaire.

Utiliser l'embout spécial fissures en le relevant à l'horizontale pour atteindre et traiter les fissures, crevasses, fentes, etc.

En cas de traitement sur des surfaces sensibles, faire un essai au préalable sur une partie cachée.

La mousse se dissout rapidement, l'efficacité persiste.

Réaliser un second traitement 15 jours après le premier pour détruire les insectes juvéniles éclos.

Les surfaces restent protégées pendant plusieurs semaines. Retraiter en cas de nouvelle infestation.

Pour un premier traitement efficace, placer les textiles au sèche-linge 20 minutes à 60°C ou au congélateur 2 jours à -18°C.

Traiter les matelas à la vapeur humide (120°C) ou sèche (150°C) pour éradiquer les oeufs et les adultes.

En cas de trop forte infestation, changer de matelas.



Référence et conditionnement

Réf. I1061 : Flacon de 500 ml - Carton de 12 unités

Précautions d'utilisation

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Aérer pendant toute la durée du traitement.

Après le traitement, aérer à fond avant de réoccuper la pièce. À titre indicatif, aérer 30 min à 2 heures en fonction du niveau de validation possible et du volume de la pièce traitée.

Le port des gants est recommandé.

Se laver les mains après manipulation.

Ne pas utiliser sur les chats ni sur les paniers pour chats.

Éloignez les chats des surfaces traitées. Ce produit biocide contient une substance pyréthriinoïde qui peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats. Si les animaux sont exposés, consulter un vétérinaire.

Élimination

Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la réglementation locale en vigueur (Grand public : en déchetterie – Professionnels : via une filière de collecte des produits dangereux).