

PHOBI LARVOX 5EC

CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE
CONTRE LES LARVES D'INSECTES

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Composition

S-méthoprène (CAS n°65733-16-6) : 6,1% m/m
Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 0.09% m/m
Formulation : concentré émulsionnable

Indications

LARVOX 5EC permet de lutter contre les larves d'insectes (puces, punaises de lit, mouches, triboliums, etc.). La substance active, le S-Méthoprène, agit en tant que régulateur de croissance chez les insectes. Elle perturbe le cycle de développement et empêche les larves de devenir adulte, ce qui entraîne une diminution de la population.

Points forts

- Formule très concentrée
- Régulateur de croissance des insectes (IGR)
- Efficacité de 6 semaines

Mode et dose d'emploi

Bien agiter la solution puis diluer 10 mL de **LARVOX 5EC** dans 5 L d'eau pour traiter 100m². Bien mélanger et pulvériser sur les surfaces à traiter. Ventiler durant toute l'application. Après traitement, aérer à fond avant de réoccuper les locaux.

Les dilutions doivent être utilisées dans les 48 heures après la préparation. Le traitement reste efficace 6 semaines après application. Renouveler le traitement si nécessaire. Bien rincer le matériel après utilisation.

Stockage et élimination

À conserver dans un endroit frais et sec. À conserver éloigné de toute source de chaleur et des rayonnements solaires. Conserver dans l'emballage d'origine. L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.



Référence et conditionnement

Réf. I7242A : Flacon de 500 ml - Carton de 4 unités

Précautions d'utilisation

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Porter des gants et se laver les mains après toute utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement. Ne pas pulvériser sur les personnes, les vêtements, les aliments, les animaux. Ne pas pulvériser sur les chats, les paniers des chats. Peut provoquer des effets indésirables. Avant le traitement, évacuer les personnes, les animaux (y compris les aquariums) et les denrées alimentaires.