


# JADE CLUSTER GRAIN

BARRES DE CÉRÉALES CONTRE  
RATS BRUNS, RATS NOIRS & SOURIS

- Appétence renforcée
- Film biodégradable à + de 30% de matière végétale



## Présentation du produit

Le **JADE CLUSTER GRAIN** est un appât innovant qui combine tous les avantages des appâts traditionnels en un seul support : la barre de céréales. Ce mix inédit de céréales entières et concassées agglomérées grâce à un liant naturel apporte une extrême appétence. Ce produit s'utilise dans tous les environnements et permet de lutter efficacement contre les rats et les souris.

## Informations réglementaires

Type de produit	TP14 – Rodenticide
Type de formulation	Appât en bloc, prêt à l'emploi (RB)
Substance active	Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)
Concentration	0,005% m/m
Amérisant	Benzoate de denatonium 10ppm
Nom homologué	JADE CLUSTER GRAIN
N° d'AMM	FR-2014-0113 - Professionnels de la lutte contre les rongeurs
Organismes ciblés	Rats bruns ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Rats noirs ( <i>Rattus rattus</i> ) Souris domestiques ( <i>Mus musculus</i> )
Application	Utilisation en intérieur, autour des bâtiments / en zones ouvertes extérieures, décharge et déchetteries (rats uniquement).

## Mode d'action

La Bromadiolone est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes en moyenne 4 à 10 jours après ingestion de l'appât.

## Conditions et doses d'emploi

Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage ou des points d'appâts couverts et protégés.

### Utilisation en intérieur, autour des bâtiments :

**Contre les rats :** 60 à 100 g de produit espacés de 5 à 10 mètres.

**Contre les souris :** 20 à 30 g de produit espacés de 2 à 5 mètres.

### Utilisation dans les décharges extérieures, déchetteries et zones ouvertes :

**Contre les rats :** 60 à 100 g de produit espacés de 5 à 10 mètres.

Inspecter les postes après 2 à 3 jours (souris) et 5 à 7 jours (rats) pour vérifier que l'appât est accepté, puis une fois par semaine. Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

**NE PAS utiliser en APPÂTAGE PERMANENT.**



## Référence et conditionnement

**Réf. R8790 :** Barres de 30 g emballées - Seau de 5 kg (Unité)

## Élimination

*Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. L'emballage ayant été en contact avec le produit ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Déposer les postes d'appâtage usagés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Éliminer les cadavres de rongeurs conformément à la réglementation locale.*

## Précautions avant utilisation

**TP14** - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr)

Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active. Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant. Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause. Vous avez peut-être affaire à des rongeurs résistants. Les postes d'appâtage contenant **JADE CLUSTER GRAIN** doivent être étiquetés avec les informations suivantes :

Nom du produit :	
<input type="text"/>	
Substance active :	Ne pas déplacer, ni ouvrir.
Difénacoum	<input type="checkbox"/> Contient un rodenticide.
Bromadiolone	<input type="checkbox"/> Antidote : Vitamine K1
Brodifacoum	<input type="checkbox"/> En cas d'incident, contacter un centre antipoison.
Autre	<input type="checkbox"/> N°ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59
<input type="text"/>	